

## 乳腺癌肿瘤有哪些类型？

虽然乳腺癌通常指的是一种疾病，但是乳腺癌也分很多类型。所有乳腺癌都原发于乳房，所以它们在某些方面类似，但在其他方面则不同。

## 非浸润性和浸润性乳腺癌

### 原位导管癌

原位导管癌 ( DCIS ) 是非浸润性乳腺癌 ( 也称为零期 ) 。“原位”指的是“在原地”。原位导管癌的异常细胞包含在乳腺管内部，没有扩散到周围的乳房组织。

### 浸润性乳腺癌

浸润性乳腺癌已经从原发部位 ( 乳腺管或者小叶 ) 扩散到周围的乳房组织，可能已经扩散到淋巴结和/或身体其它部位。



## 浸润性乳腺癌的类型

浸润性乳腺癌最常见的类型是浸润性导管癌。它原发于乳腺管 ( 将母乳运送到乳头的管道 ) 内。浸润性小叶癌是下一个最常见的类型。它原发于小叶 ( 乳房内产生乳汁的囊 ) 。

有些不常见的浸润性乳腺癌往往具有良好的预后 ( 结果 )

- 它们是：
- 粘液 ( 胶质 ) 癌
- 乳头状癌，和
- 乳腺小管癌。

## 浸润性乳腺癌的特殊形态

其他形态的乳腺癌包括炎性乳腺癌、佩吉特病和化生性乳腺癌，尽管它们不属于特定类型的肿瘤。

炎性乳腺癌属于罕见的侵犯性肿瘤。主要症状是乳房肿胀发红，占所有乳腺癌的百分之一至五。其他形态的乳腺癌可能很多年都没有症状，而炎性乳腺癌的症状往往出现于几周或几个月内。出现以下任何症状，要向医生报告：

- 乳房肿胀或变大
- 乳房发红（也可呈粉红色或略带紫色）
- 乳房皮肤凹陷或者起皱
- 乳头有牵拉感
- 乳房疼痛
- 虽然可能感觉到肿块，但是相比其他乳腺癌，炎性乳腺癌的肿块并不常见

有些症状可能被误认为是乳房感染。炎性乳腺癌往往在抗生素未能改善症状后诊断出来。如果你出现这些症状，且使用抗生素治疗超过一周后仍存在，要告诉医生。不要害怕征求其他医生的意见。

**佩吉特病**是罕见的乳腺癌，出现于乳头皮肤或者乳头周围的皮肤中。出现下述任何一种症状，要向医生报告：

- 乳头和乳晕皮肤瘙痒，有灼烧感，发红，起鳞屑
- 乳头分泌血性溢液
- 乳头内缩

肿瘤可能生长于乳头下方，然后突破到乳头皮肤之上。百分之一到三的乳腺癌属于佩吉特病。

**化生性乳腺癌**比较罕见，占所有浸润性乳腺癌病例的不足百分之五。这些肿瘤往往比其他常见类型的乳腺肿瘤大。由于化生性肿瘤存在多种形态，所以往往难以确诊，常与其他不常见的乳腺肿瘤相混淆。